

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne



Ministère de l'Agriculture
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
62, avenue Nationale - La Neuville
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone : 26.09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel :

180 F

ÉDITION - GRANDES CULTURES

ISSN 0295 - 5776

- 1 -

BULLETIN N° 34 du 5 FEVRIER 1988

BLÉ	:	MALADIES	:	Situation.
		MOUCHE GRISE	:	Pas d'évolution.
		LIMACES	:	Surveiller les parcelles.
		DECOLLEMENT DE L'EPI	:	communiqué ITCF Aube.
COLZA	:	LARVES d'ALTISE et de CHARANCON	:	le point dans la Haute-Marne et le Nord de la Marne.
		MALADIES	:	Situation.
PENSEZ A VOUS REABONNER.				

BLÉ

MALADIES du FEUILLAGE

Les nombreux prélèvements effectués dans la région montrent une présence quasi généralisée d'oïdium. Ce dernier est particulièrement actif sur les variétés sensibles. On rencontre également sur quelques parcelles des pustules de rouille brune et des symptômes de septoriose (*Septoria tritici*) sur les feuilles les plus âgées.

MALADIES du PIED

Outre la fusariose, apparition des tous premiers symptômes de rhizoctone et de piétin-verse très localement.

MOUCHE GRISE

Situation :

Les dernières analyses de terre (celles du 28/01 et du 3/02) montrent une quasi stagnation des éclosions d'oeufs (5 à 7 %). Les pénétrations larvaires n'évoluent pas : 1 à 2 % dans les parcelles à risque suivies dans l'Aube et la Marne.

Par contre la levée de diapause des oeufs a progressé (80 %).

Ce suivi de l'évolution des mouches confirme le précédent bulletin (éclosions précoces mais très progressives).

Préconisation :

Attendre pour intervenir.

P.1.7

LIMACES

Situation :

Les attaques de limaces se poursuivent. Les symptômes les plus fréquents sont la présence de feuilles finement découpées en lanière.

Préconisation :

Continuez à visiter régulièrement vos parcelles.

DECOLLEMENT de l'EPI

Aucun décollement de l'épi n'est observé dans la Marne. Par contre, début de décollement dans l'Aube et la Hte-Marne, sur blé tendre d'hiver.

Communiqué de l'ITCF Aube

Les premiers décollements sont observés sur les variétés Thésée - Scipion - Camp-Rémy pour les semis de fin septembre - début octobre dans l'Aube surtout sur les précédents pois.

Actuellement, il ne faut surtout pas accélérer cette croissance par un apport d'azote. Ce dernier ne pourra pas être effectué avant le 15-20 février et ceci sans modification du fractionnement mis en oeuvre habituellement.

L'application d'un régulateur est à proscrire car les températures actuelles ne favorisent pas sa pénétration donc une efficacité faible à nulle.

De plus, ce stade épi décollé pourra se prolonger sur une période beaucoup plus longue qu'habituellement.

COLZA

Dans de nombreuses parcelles, les colzas redémarrent et on assiste à un décollement du bourgeon terminal. Le stade varie donc de rosette à début d'élongation.

LARVES d'ALTISE et de CHARANCON du BOURGEON TERMINAL

Situation :

Les derniers sondages réalisés en Haute-Marne et en Marne confirment la très faible présence de populations larvaires.

Lieu	Stade	% pieds touchés par larve d'Altise	% pieds touchés par larve de charançon du Bourgeon terminal
Marne			
Vézilly - Dormans	Rosette à allongement	0	4
Romigny	" "	8	0
Prouilly-Muizon	" "	0	0
Boult/S.	Rosette	0	0
Fresne les Reims	Rosette	0	0
Hte-Marne			
Richebourg	9 f	0	0
Chaumont	7 f	4	0
Nomécourt	7 f	52	0
Maizières	8 f	8	0
Colombey			
2 Eglises	8 f	0	0
Arc en Barrois	7 f	4	0

Préconisation :

Il est inutile de faire un traitement de rattrapage contre les altises et les charançons du bourgeon terminal.

MALADIES

Situation :

Des taches de phoma et d'alternaria sont visibles un peu partout mais elles ne présentent pas de caractère de gravité.

Préconisation :

Ne pas intervenir.

Si vous recevez plusieurs bulletins à la même adresse veuillez nous le signaler afin de procéder aux rectifications nécessaires. Merci.